

TUMOR DE KLATSKIN, SEU DIAGNÓSTICO TARDIO E OS PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS DE ICTERÍCIA OBSTRUTIVA: RELATO DE CASO.

Anna Carolina Amizo¹; Enã Rezende²; Gabriel Gonçalves²; Marina Lehen de Oliveira¹

RESUMO

INTRODUÇÃO: Os tumores de Klatskin são tumores das vias biliares extra-hepáticas proximais e embora correspondam a 25% dos colangiocarcinomas, sua incidência é em torno de 0,01% e 0,8%, tornando seu diagnóstico difícil quanto à diferenciação das outras etiologias de icterícia obstrutiva.

OBJETIVOS: Relatar um caso de tumor de Klatskin, procurando diferenciar as etiologias de icterícia obstrutiva, visto a urgência necessária do seu diagnóstico e conduta para uma maior sobrevivência de seus portadores.

RELATO DO CASO: Paciente J. M. A. M,

masculino, 65 anos, branco, hipertenso e diabético, refere quadro de icterícia intensa, iniciado há 40 dias associado a hiporexia e emagrecimento de 15kg no período, além de colúria, melena e prurido cutâneo.

CONCLUSÃO: O tumor de Klatskin é uma entidade rara e de tratamento difícil com alta morbimortalidade, tornando importante o seu reconhecimento precoce para o adequado manejo desses pacientes. Devido ao diagnóstico avançado no caso relatado, concluiu-se que não foi possível estabelecer conduta terapêutica adequada, culminando com o óbito do paciente.

PALAVRAS-CHAVE: Icterícia obstrutiva; Tumor de Klatskin; Colelitíase, Diagnóstico diferencial; Tratamento; Intervenção

Trabalho realizado na Faculdade de Medicina da Universidade de Cuiabá - Departamento de Urgência e Emergência.

1. Acadêmica do 5º Ano do Curso de Graduação em Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Cuiabá-MT.
2. Acadêmico do 5º Ano do Curso de Graduação em Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Cuiabá-MT.

ABSTRACT

INTRODUCTION: *Klatskin tumors are tumors of the proximal extrahepatic biliary tract and although they correspond to 25% of cholangiocarcinomas, their incidence around 0.01% and 0.8%, respectively, making it difficult to distinguish between the other etiologies of obstructive jaundice*

OBJECTIVES: *To present a case of Klatskin tumor, aiming to differentiate the etiologies of obstructive jaundice .*

CASE REPORT: *Patient J. M. A., male, 65 years old, white, hypertensive and diabetic, intense jaundice, started 40 days ago*

associated with hyporexia and weight loss of 15 kg, besides coluria, melena and cutaneous pruritus.

CONCLUSION: *Klatskin tumor is rare and difficult to treat, with high morbidity and mortality, which is important its early recognition to ensure the adequate management of the patients. Due to the unrelated advanced diagnosis, the conclusion is that it was not possible to establish an adequate therapeutic course, culminating in the death of the patient.*

Trabalho realizado na Faculdade de Medicina da Universidade de Cuiabá - Departamento de Urgência e Emergência.

1. Acadêmica do 5º Ano do Curso de Graduação em Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Cuiabá-MT.

Acadêmico do 5º Ano do Curso de Graduação em Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Cuiabá-MT.